

Indice de autores


(Año 1976)

(Volumen XIII)

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
A		L	
Adea Roque, G.	27	Landry, F.	191
Altisench, A.	33, 179		
B		M	
Balagué, G.	131	Meynaud, J.	117
Balius, R.	95	Miranda, J.	221
Bayés de Luna, A.	7, 79, 201	Miyashita, M.	19
Bestit, L.	7, 201		
C		N	
Corbera, R.	131	Navarro, F.	37
D		O	
Dalmau, J.	41	Oter, F.	7, 201
E		P	
Estruch, J.	131	Prat, J. A.	145
F		Puig, N.	157
Ferrer-Hombravella, J.	73		
G		S	
Gual, J. A.	227	Seirullo, F.	93
Guerra, T.	83	Serra-Grima, J. R.	7, 79, 201
J		T	
Janáriz, J.	89	Tintoré, S.	7
		V	
		Ventura, J. L.	7, 79, 201
		Vicente, P.	209
		Vladescu, F. L.	11

PERCUTALIN

Antiálgico y antiinflamatorio percutáneo



Fórmula por ampolla (no inyectable)

Dexametasona	1 mg.
Salicilamida	170 mg.
Salicilato de etilenglicol	200 mg.
Nicotinato de metilo	10 mg.
Excipiente c.s.p.	2 c.c.

Dosificación:

De ataque: 2-4 ampollas (no inyectables) diarias durante un período comprendido entre 2 y 6 días.

Indicaciones Terapéuticas:

Esguinces, roturas y contusiones de músculos, tendones y ligamentos.

Artritis, artrosis, periartrosis, sinovitis, ciática, dolores cervicales, neuralgias, lumbago, agujetas, etc.

En reumatología, traumatología, reeducación funcional. Medicina general y laboral. Antiálgico de aplicación local percutánea.

Contraindicaciones:

Alergias a los derivados salicílicos. No aplicarlo sobre lesiones cruentas, piel irritada y mucosas.

Caja con 12 ampollas percutáneas de 2 c.c. autorrompibles 105,10 ptas.



Industrial Farmacéutica de Levante, S.A.

Mallorca, 216 - BARCELONA

*"habla muchos, hay muchos
y no se sabe cuantos habrá, pero...
un verdadero avance en terapéutica
no nace cada día."*

naprosyn®

antiinflamatorio y analgésico

el presente en el tratamiento de los reumatismos:

lograr para los enfermos reumáticos
una nueva forma de vida
compatible con su entorno social.

naprosyn cápsulas
envase único, frasco con 30,
conteniendo cada una 250 mg.
de Naproxén Syntex. P.V.P. 382,50 Ptas.

naprosyn supositorios
envase único, caja con 12,
conteniendo cada uno 500 mg.
de Naproxén Syntex. P.V.P. 250,70 Ptas.

Procesos reumáticos de diversa etiología, procesos traumáticos, y en general siempre que se desee un efecto antiinflamatorio y analgésico en afecciones respiratorias, urológicas, vasculares, etc. Aunque no existen contraindicaciones absolutas, cualquier enfermo con historia de procesos gastrointestinales debe ser cuidadosamente vigilado. No debe administrarse junto a productos como la hidroxicumarina, heparina, salicilatos, prolongados o salicilatos, si bien en clínica no se han reportado repercusiones por estas circunstancias. Naprosyn es el (S)-2-(6-oxoheptanoil)ácido propiónico. 500-750 mg al día es la dosis media más usual.