

Indice de autores

Año 1977

(Volumen XIV)

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
B		L	
Balagué, G.	185	Landry, F.	83
Balius Juli, R. 31, 45, 169.	219	Lorente, J. I.	17
Battistini, R.	13		
C		M	
Castelló, A. 131.	163	Melo, E.	107
Clarys, J. P.	67	Mercado, M. C.	185
		Miranda, J.	137
D		Morandeira, J. R. 95,	193
Dufour	199		
E		P	
Estruch, J.	131	Puig Barata, N.	205
		Pujol, J.	157
F		R	
Fernández Borovia, J.	163	Ryn, Z.	7
G		T	
Gómez, J. J.	209	Tena Marsá, J.	25
J		V	
Jiskoot, J.	67	Vicente Monjó, P.	143

Trifortal®

LAS 3 FORMAS ACTIVAS DE LA VIT. B₆



VIT. B₆ + VIT. B₆ + VIT. B₆

COMPOSICION

	Piridoxol	Piridoxal	Piridoxamina
500 mg.			
por cápsula:	350 mg.	75 mg.	75 mg.

INDICACIONES

- **INVOLUCION SENIL Y PRESENIL**
(p. ej.: pérdida de memoria, falta de concentración).
- **TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA**
(p. ej.: problemas de adaptación al medio, problemas de escolaridad, oligofrenias).
- **NEURALGIAS, NEURITIS**
- **ETILISMO**

TOLERANCIA

La vitamina B₆ en sus tres formas es absolutamente inocua.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado el uso de la vitamina B₆ durante el tratamiento de Parkinson con L-Dopa; sin embargo, en otros tratamientos anti-colinérgicos del Parkinson no resulta en contraindicación.

DOSIFICACION

Por término medio se recomienda la administración de una cápsula diaria de TRIFORTAL. Por la atoxicidad de los compuestos y para obtener la máxima acción farmacodinámica, las dosis pueden en caso necesario, y según la evolución y criterio del médico, aumentarse cuando la clínica lo aconseje.

PRESENTACION

TRIFORTAL, frasco de 20 cápsulas P.V.P. 488,- Ptas.



LABORATORIOS FARMACEUTICOS

Novofarma S.A.

FLEXAGIL

FLEXIBILIDAD • AGILIDAD

FORMULA: Por comprimido:

Carisoprodol 300 mgrs.
Amidofenazona 200 mgrs.

Por supositorio: Doble cantidad

DOSIFICACION: 1 ó 2 comprimidos o
1 supositorio 3 veces al día.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Esguinces, torceduras y contusiones
musculares. Miositis inflamatorias,
infecciosas o víricas (gripe). Artrosis.

Torticolis, Lumbago. Artritis (escapulo-
humeral, síndrome hombro-mano,
lumbalgias, hernia discal).

Síndrome del escaleno. Medicina laboral
y deportiva.

Contraindicaciones: Sensibilidad a
los derivados pirazolónicos.

EFFECTOS SECUNDARIOS:


Somnolencia o euforia. Dispepsia
gástrica.

Caja con 24 comprimidos

92'50 pts.

Caja con 12 supositorios

92'50 pts.



Industrial Farmacéutica de Levante, S.A.

Mallorca, 216 - BARCELONA

"habla muchos, hay muchos
y no se sabe cuantos habrá, pero...
un verdadero avance en terapéutica
no nace cada día."

naprosyn[®]

antiinflamatorio y analgésico

el presente en el tratamiento de los reumatismos:

lograr para los enfermos reumáticos
una nueva forma de vida
compatible con su entorno social.

SYNTEX IBERICA, S. A. - Gran Vía Carlos III, 84, 28014 Madrid

naprosyn cápsulas
envase único, frasco con 30,
conteniendo cada una 250 mg.
de Naproxén Syntex. P.V.P. 382,50 Ptas.

naprosyn supositorios
envase único, caja con 12,
conteniendo cada uno 500 mg.
de Naproxén Syntex. P.V.R. 296,70 Ptas.

Procesos reumáticos de diversa etiología, procesos traumáticos, y en general siempre que se desee un efecto antiinflamatorio y analgésico en afecciones respiratorias, urológicas, vasculares, etc. Aunque no existen contraindicaciones absolutas, cualquier enfermo con historia de procesos gastrointestinales debe ser cuidadosamente vigilado. No debe administrarse junto a productos como la hidroxicumarina, hidantoína, sulfonamidas prolongadas o salicilatos, si bien en clínica no se han reportado repercusiones por estas circunstancias. Naprosyn es el d-2 (naproxinafili) ácido propiónico. 500-750 mg. al día es la dosis más adecuada.