

NECROLOGICA

EN LA MUERTE DE JOAQUIN CABOT



Hace dos números, las páginas de nuestra Revista se entristecían con el último adiós a Carlos Camúñez. Hoy, de nuevo, vuelven a ensombrecerse ante el recuerdo y la pérdida de una de las figuras más importantes de la Medicina Deportiva española.

Se ha ido Joaquín Cabot y su muerte le sorprendió luchando, como siempre había sido su vida: una constante lucha contra el tiempo. Creo que su amor por el Deporte, configuró una conducta y una posición existencial de permanente competición.

Conseguiste Joaquín un prestigio profesional tanto en la Medicina Deportiva como fuera de ella, que nadie puede discutirte. Durante mucho tiempo, tu nombre fue identificado con la totalidad de la acción médica en el deporte español, y tú fuiste sin duda la personalidad más relevante fuera de nuestras fronteras.

No sé si las circunstancias o tu forma de ser, te llevaron a luchar «por libre» en la mayoría de las ocasiones, ello comportó el que estuvieras alejado de la dirección de la Medicina Deportiva del país, cuando sin duda eras el más indicado.

Luchaste Joaquín hasta el último momento, y tanto el reciente Congreso del Grupo Latino de Lisboa como tu quirófano de la Residencia «Príncipes de España» fueron testigos fehacientes; pero en esta ocasión fuiste vencido en el mismo campo donde tantos triunfos habías logrado.

Desde estas páginas, que nos consta eran para ti especialmente entrañables, te damos el último y más sentido adiós.

Jesús Galilea.

Medicina Deportiva

**Un ejemplo de sinergismo
en el tratamiento del dolor**

Dolosarto[®]

Antidoloroso Trisinérgico



**MADAUS
CERAFARM, S.A.**

Apartado 9116.
Tel. (93) 331 26 00. Barcelona

Medicina Deportiva

Dolosarto[®]

Antidoloroso Trisinérgico

Indicaciones en Medicina Deportiva

- Contusiones
- Algas post-traumáticas
- Tendinitis, dolores reumáticos

Otras indicaciones

- Estados gripales y/o febriles, cefaleas, resfriado común, etc.
- Odontalgias, otalgias, faringitis, etc.

Dosificación

- Niños (2-6 años) 1/4 tableta x 3 veces al día
- Niños (6-12 años) 1/2 tableta x 3 veces al día
- Adultos 1 tableta x 3 veces al día

Presentación y P.V.P.

- Tubo con 16 tabletas efervescentes, 131 ptas.

Contraindicaciones e incompatibilidades

- Úlcera gastroduodenal; alergia a alguno de sus componentes.
- Puede aumentar la acción de los anticoagulantes orales.

Efectos secundarios. Intoxicación y su tratamiento

- A dosis elevadas, podrían presentarse excepcionalmente náuseas o ardor.
- En caso de intoxicación por ingestión de dosis excesivas, se suprimirá la medicación, adminis-

Composición

Por tableta: 1-bencil-3-(3-dimetilaminopropoxi)-1-indazol clorh. (benzidamina), 50 mg; ácido acetilsalicílico, 500 mg; 7-cloro-1,3-dihidro-3-

-hidroxi-5 fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (oxacepan), 5 mg; benzo-sulfimida sódica, 10 mg; excipiente c.s.