

ELOY GONZALEZ SIMEONI HA MUERTO

Otra vez esta Revista ve entristecidas sus páginas con la noticia, dolorosa siempre, de la muerte de un amigo: Entrañable y viejo amigo el que se nos ha ido.

A Eloy nos unían lazos de amistad que se remontan a años en que, todavía muchos de nosotros, frecuentábamos aún las aulas universitarias: Añorados y ya lejanos años de los Juegos Nacionales Universitarios, en los que Eloy iniciaba sus primeros contactos con una Medicina Deportiva de la que él fue uno de sus pioneros.

Vendrían después, ya como colegas en la profesión, los primeros cursos de la especialidad, los iniciales pasos en la creación de la Federación Española de Medicina Deportiva, las primeras salidas al extranjero (con nada por enseñar y mucho por aprender), las ilusiones y desengaños por algo en lo que él ha dejado su vida y nosotros una parte importante de la nuestra.

Impregnó de integridad, honradez y modestia su paso por la breve historia de nuestra Medicina Deportiva, tan llena de sobresaltos e incomprensiones, y calladamente, como siempre hizo, se nos ha ido definitivamente.

Pese a su aparente excepticismo, entregó lo mejor de sí mismo a una tarea en la que él tuvo permanente fe y esperanza. Hasta muy cerca de su muerte mantuvo íntegra su ilusión por llevar a buen puerto un barco que hacía aguas por doquier: No hace mucho, todos los médicos deportivos españoles recibíamos un escrito firmado por él, quizás el último de su última esperanza, en el que se nos convocaba a un postrero, y posiblemente utópico esfuerzo por reavivar los viejos sueños de Arapiles 16.

Era más un hombre de charla entre amigos que orador de congresos, más bien diría que su espontánea naturalidad y su fácil argumentación en privado se resentían seriamente cuando en alguna ocasión. —pocas, pues deliberadamente las eludió—, tuvo que intervenir

en público. Fue un hombre modesto y tremendamente tímido, estas fueron sus grandes virtudes pero también sus grandes limitaciones, sobre todo en un país de balandronadas y fanfarronerías.

Fiel a ultranza hacia sus más íntimas convicciones, no fue en cambio la intransigencia su norma de conducta. Por el contrario, y en muchas ocasiones, su decisiva intervención limó más de una aspereza entre los médicos deportivos españoles.

Hoy que Simeoni ya no está entre nosotros, su imagen, —cigarro sempiterno en la boquilla y profunda sonoridad en la voz—, quedará unida para siempre a los viejos y queridos lugares en los que todos, alguna vez, hemos coincidido con el bagaje de nuestras ilusiones y también de nuestros frustrados intentos: el Pabellón de Deportes, el Gimnasio Moscardó, Arapiles, I.N.E.F. y Centro de Investigación de Madrid.

Con su desaparición se cierra definitivamente todo un capítulo de la Medicina Deportiva española en la que él, sin duda, no jugó el papel más brillante pero sí el más íntimo y entrañable.

Descansa en paz Eloy y llévate el recuerdo emocionado de los que fuimos ante todo, tus amigos.

Jesús Galilea.

percutalin gel

Infale

asociación córtico salicílica
(nueva presentación)

de aplicación local
penetra profundamente
a través de la epidermis



percutalin

calma el dolor
y acorta el período de impotencia funcional

FORMULA POR 100 GRS. DE GEL:

Dexametasona	0,05 gr.
Salicilamida	2,00 "
Nicotinato metilo	0,50 "
Salicilato etilenglicol	10,00 "
Excipiente c.s.p.	100,00 "

ACCION:

Medicación córtico-salicilada, de absorción percutánea, con muy escasa acción general hormonal, propia de los corticoides.

INDICACIONES:

Artrosis, artritis, contusiones, torceduras, distensiones, tenosinovitis. Secuelas dolorosas post-

traumáticas. Reeducción funcional. Medicina laboral. Medicina deportiva.

POSOLOGIA:

Aplicar de 2 a 4 gr. utilizando la espátula dosificadora en un promedio de tres veces al día. Esparcir suavemente sin frotar. Puede cubrirse la zona con un apósito o bien dejar que se seque al aire.

CONTRAINDICACIONES:

Alergias derivados salicílicos. Debe guardarse cierta prevención en pacientes afectos de osteoporosis acentuadas, úlcera gastro-duodenal en actividad, psicosis severas.

INCOMPATIBILIDADES:


No aplicar sobre heridas abiertas, ni superficies cruentas, zonas de piel herpéticas o eccematosas.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Los propios de la corticoterapia, si bien la absorción percutánea rebaja a una cuarta parte los efectos tóxicos que podrían producirse empleando la vía oral.

PRESENTACION y P.V.P.:

Tubo con 30 grs. de gel, calibrado en espacios lineales de 2 grs. para ajustar dosis. 128 Pta.



ACTOL®

El ACTOL (Acido Niflúmico) tiene unas pronunciadas características antirreumáticas, antiflogísticas y analgésicas. ACTOL no posee acción antiinfecciosa ni tampoco hormonal.

COMPOSICION CUANTITATIVA

Acido Niflúmico	250 mg
Excipiente c.s.p.	1 cápsula

INDICACIONES

Afecciones reumáticas y reumatoides, por ej. poliartritis, artritis reumatoide, osteoartritis, coxartrosis, espondilitis y gota artrítica aguda.

Reumatismo de partes blandas, por ej. bursitis, tendinitis, sinovitis, periartitis escapulohumeral, ciática, lumbago.

Estados flogísticos y edemas, por ej. distorsiones, contusiones, anexitis, tromboflebitis y postquirúrgico en otorrinolaringología. En Odontología, por ej. en todos los síndromes inflamatorios y álgicos dentarios, tales como: después de extracciones dentarias, alveolitis, abscesos, flemones, gingivitis, estomatitis, periodontitis.

DOSIFICACION

Como dosis normal se considera 1 cápsula 3 veces al día (750 mg), sólo en casos de excepción podrá aumentar esta dosis a 4 cápsulas al día. Después de haberse iniciado la mejoría, se puede, en muchos casos, reducir la dosis a 2 cápsulas al día. El efecto del ACTOL se inicia rápidamente. En estados crónicos existentes desde largo tiempo (por ej. reumatismo articular) se intensifica más el efecto dentro de las 2-3 primeras semanas.

NORMAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION

Se aconseja no tomar las cápsulas de ACTOL en ayunas, sino sólo durante las comidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Excepcionalmente pueden presentarse molestias gastrointestinales, generalmente de tipo ligero y pasajero en pacientes hipersensibles. Dicho efecto sobre el tracto gastrointestinal, puede evitarse perfectamente, mediante la correcta toma de las cápsulas durante las comidas. Pacientes que sean gastrosensibles, es mejor que tomen el ACTOL durante las comidas con un vaso de leche. En pacientes con una anamnesis de úlcera hay que llevar a cabo el tratamiento bajo control médico.

CONTRAINDICACIONES

El ACTOL está contraindicado en pacientes que presentan una alergia conocida al ácido niflúmico, así como en pacientes afectados de úlcera gastroduodenal.

Como actualmente las experiencias en el embarazo son todavía limitadas, conviene no administrar, de momento, el medicamento durante el mismo.

INCOMPATIBILIDADES

Si el ACTOL se administra simultáneamente con un anticoagulante, entonces hay que determinar, al iniciar el tratamiento, los valores Quick y controlarlos con regularidad.

PRESENTACION y P.V.P.

Envase con 30 cápsulas. 400'— ptas.



CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN GmbH - MUNICH (ALEMANIA)

En España: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. - Apartado, 488 - Barcelona