

# Editorial

## *Acoso y derribo*

Con asombro asistimos a la encarnizada disputa que, de un tiempo a esta parte, mantiene la Administración con el estamento deportivo, —léase federaciones—, y sería hasta divertido el espectáculo si no estuviera en juego algo importante que pertenece al patrimonio de un pueblo, y no al capricho del político o directivo de turno.

Entre auditorias y amenazas de unos, el acoso de la banca estatal a clubs endeudados hasta las cejas, —imagino que el Campeonato Mundial de Fútbol interesaba a todos, ¿o no?—, y las manifestaciones destempladas y la absurda creación de una asociación federativa paralela, —y opuesta suponemos—, al COE por otros, el caso es que al deporte español lo están dejando como unos “zorros”.

A todo esto optamos por una Olimpiada a celebrar dentro de nueve años...

De risa, si no fuera porque se está jugando con el prestigio del país, no sólo en lo deportivo, aunque ya sería bastante.

Aquí lo que hay que hacer es tirar de la manta y acabar de una vez con la farsa. Si se comprueban y demuestran apropiaciones indebidas o “alegrías” económicas con dineros públicos, a la cárcel o a la calle; pero si todo son sospechas y celos o, lo que es peor, enfrentamientos político-personales, que se deje en paz al deporte y que las conductas viscerales de unos y otros deriven hacia formas de liberación fisiológica que todos conocemos.

El acoso y derribo va unido íntimamente a la fiesta de toros, pero en el DEPORTE ni hay picas, ni tentaderos ni cuernos... al menos que yo sepa.

J.G.

# REFLEX

## Spray

### Analgésico osteo-músculo-articular

**COMPOSICION:** Cada cc.: DMSO (Dimetilsulfóxido), 60 mg; Salicilato de metilo, 20 mg; Mentol, 30 mg; Alcanfor, 30 mg; Esencia de trementina, 50 mg; Alcohol-bencílico, 10 mg.  
**ACCION:** Favorecida por el dimetil-sulfóxido, analgésico-antiinflamatoria (salicilato de metilo) vasodilatadora y revulsiva suave (esencias aromáticas) de interés especial en medicina deportiva, de empresa y traumatológica.

**POSOLOGIA:** Uso exclusivo tópico. Proyectar sobre la zona afectada desde una distancia de 5-10 cm. durante unos segundos. Repetir la aplicación varias veces al día, S.C.M. No frotar.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES

La proyección sobre los ojos, las mucosas o sobre piel erosionada puede producir irritación, por lo que debe evitarse su aplicación en estas zonas.

**INCOMPATIBILIDADES. INTOXICACION.** No se han observado  
**PRESENTACION Y P.V.P.:** Solución, frasco para aerosol con 50 cc., 187 ptas.; con 200 cc., 281 ptas.



**INDICACIONES:** Miositis, lumbalgias, torticolis, contusiones y distensiones ligamentosas. Rotura de fibras, tendo-sinovitis, esguinces, hematoma traumático.

