

Necrológica

Adiós, José María

Nuevamente vuelven a ensombrecerse las páginas de "APUNTS" con la despedida definitiva a uno de nuestros amigos.

En una mañana fría y gris, la vida de JOSE MARIA CAGIGAL ha sido seguida en un brutal e inexplicable accidente aéreo. Es difícil poder ordenar, siquiera mentalmente, el cúmulo de recuerdos, de palabras entrecruzadas, de ilusiones compartidas, de amarguras sufridas en común, pero aunque pudiera no lo haría pues corresponde al diálogo afectivo e íntimo de dos amigos, a ese caudal de vivencias que proporciona una vieja y entrañable amistad, que se mantuvo pese a todo y a todos.

La figura más importante de la Educación Física y del Deporte de este país ha desaparecido para siempre, y de nada sirven ahora las lamentaciones a destiempo o los propósitos que no se cumplieron. Una vez más la "fuga", en esta ocasión para siempre, ha sido dramático final de una vida consagrada a una tarea incomprendida. Triste sino el de este país que sólo se acuerda de sus mejores hombres cuando ha de entonar oraciones funerarias por ellos.

Te has ido JOSE MARIA y has helado en el corazón de los que te queríamos, las últimas ilusiones y los últimos anhelos que, pese a todo, aún manteníamos despiertos.

Lejos quedan los días aquellos en que luchabas, casi solo, por dar a España su primer Instituto de Educación Física; lejano también tu decidido apoyo a la entonces incipiente Medicina Deportiva, pero queda viva y actual toda una teoría filosófica sobre el Deporte a la que consagraste tu vida y a la que dedicaste incluso los últimos momentos de ella, cuando en



aquella fría mañana partías hacia Roma a llevar el mensaje de tu experiencia y de tus profundas convicciones.

Pienso JOSE MARIA que te has marchado triste y desengañado, y esto es lo que más duele ahora a tus amigos de siempre.

Después del largo y ciego ostracismo a que se te condenó los últimos años de tu vida, durante los cuales no sólo se te afligió anímicamente, sino que se te llegaron a crear graves problemas de toda índole, afectando incluso la estabilidad económica de tu propia familia, ahora, a tu muerte, se hacen tardías reflexiones sobre lo que se ha perdido con ella.

Yo no puedo decirte más que los que contigo estuvimos desde la primera hora, —aunque a veces manteniendo criterios distintos—, seguiremos estando contigo a través de lo que nos has legado: Tu ejemplaridad, tu apasionada vocación, tu obra... pero sobre todo por aquellos momentos íntimos, en los que aprendimos a conocernos mutuamente y en los que casi siempre el Deporte era el tema de nuestra conversación, ese Deporte al que tú tanto has amado y que tan mal te lo ha compensado.

**ADIOS JOSE MARIA,
 DESCANSA EN PAZ.**


Jesús Galilea

percutalin gel

(Infale)

asociación córtico salicilica
(nueva presentación)

de aplicación local
penetra profundamente
a través de la epidermis



percutalin

calma el dolor
y acorta el período de impotencia funcional

FORMULA POR 100 GRS. DE GEL:

Dexametasona	0,05 gr.
Salicilamida	2,00 -
Nicotinato metilo	0,50 -
Salicilato etilenglicol	10,00 -
Excipiente c.s.p.	100,00 -

ACCION:

Medicación córtico-salicilada, de absorción percutánea, con muy escasa acción general hormonal, propia de los corticoides.

INDICACIONES:

Artrosis, artritis, contusiones, torceduras, distensiones, tenosinovitis. Secuelas dolorosas post-

traumaticas. Reeduación funcional. Medicina laboral. Medicina deportiva.

POSOLOGIA:

Aplicar de 2 a 4 gr. utilizando la espátula dosificadora en un promedio de tres veces al día. Esparcir suavemente sin frotar. Puede cubrirse la zona con un apósito o bien dejar que se seque al aire.

CONTRAINDICACIONES:

Alergias derivados salicilicos. Debe guardarse cierta prevención en pacientes afectos de osteoporosis acentuadas, úlcera gastro-duodenal en actividad, psicosis severas.

INCOMPATIBILIDADES:

No aplicar sobre heridas abiertas, ni superficies cruentas, zonas de piel herpéticas o eccematosas.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Los propios de la corticoterapia, si bien la absorción percutánea rebaja a una cuarta parte los efectos tóxicos que podrían producirse empleando la vía oral.

PRESENTACION y P.V.P.:

Tubo con 30 grs. de gel, calibrado en espacios lineales de 2 grs. para ajustar dosis. 128 Ptas.